

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 25-7-67 676933

PUBLICATION MENSUELLE

## ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE (78) 37-20-56

Abonnement annuel: 25 F.

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 82 de juillet 1967

22 juillet 1967

page 27

### AVERTISSEMENTS

### TOUTES CULTURES

#### A - TRAITEMENTS POUVANT ÊTRE SUSPENDUS:

- MILDIOU DE LA VIGNE - jusqu'au traitement d'aoûtement qui pourra être appliqué sur les nouvelles pousses dès après la première période pluvieuse.
- BLACK-ROT DE LA VIGNE (zones contaminées) - sur les vignes absolument indemnes seulement.
- VERS DE LA GRAPPE - sauf dans les régions élevées et en Hte Savoie où un produit à caractère curatif (types esters phosphoriques) devra être appliqué dès réception.
- TAVELURES DU POMMIER ET DU PORIER - sur les plantations indemnes ou portant très peu de taches. De toutes façons, prévoir un traitement à l'aide d'un fongicide de synthèse de 15 jours à 3 semaines avant la récolte.
- MILDIOU ET ALTERNARIA SUR POMME DE TERRE ET TOMATE

#### B - TRAITEMENTS A POURSUIVRE OU A REPRENDRE:

- OIDIUM DE LA VIGNE - sur cépages sensibles
- OIDIUM DU PECHER - sur variétés sensibles dans les limites imposées
- OIDIUM DU CASSISSIER - dès après la fin de la récolte
- CARPOCAPSE DES POMMES, des POIRES, des PRUNES et des NOIX - en toutes régions (il n'y aura nulle part d'interruption sensible entre les deux générations) assurer une protection parfaite pendant toute la période du 22 au 31 juillet au moins.
- TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - en toutes régions, assurer également une protection parfaite et continue jusqu'à nouvel avis, l'activité de la 2ème génération étant partout proche de son maximum.
- MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS (pêches, puis poires) - effectuer un traitement dès que le piégeage révélera la présence de l'insecte dans les plantations.
- MINEUSE ELARGIE DES FEUILLES DU POMMIER - Effectuer un traitement dès réception dans le foyer des Mts d'Or lyonnais (3ème génération).
- TEIGNE DU POIREAU - en période sèche, renouveler les traitements à 10-12 jours d'intervalle à l'aide d'un insecticide à base de D.D.T., Sevin, Parathion, Malathion, etc...

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux  
A.PITHIoud

L'Agent technique chargé des  
questions maraîchères  
G.FERAND

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles  
P.LATARD